



# DEFINIÇÕES DAS DOENÇAS CONTEMPLADAS NO PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

- **Diabetes mellitus** – Qualquer individuo com diabetes em tratamento com medicação oral ou injetável.
- **Pneumopatias crônicas graves** - Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (em uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
- **Hipertensão Arterial Resistente** - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
- **Hipertensão arterial estágio 3** - PA sistólica  $\geq 180\text{mmHg}$  e/ou diastólica  $\geq 110\text{mmHg}$  independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.
- **Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com comorbidade e/ou lesão em órgão-alvo** - PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg, na presença de comorbidade e/ou lesão em órgão-alvo(por exemplo: comprometimento de coração, rins).
- **Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada** - em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association.
- **Cor-pulmonale crônico e Hipertensão pulmonar primária ou secundária.**
- **Cardiopatia hipertensiva** - Hhipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).
- **Sindromes coronarianas crônicas** - Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras.



- **Valvopatias** - Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).
- **Miocardiopatias e Pericardiopatias** - Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.
- **Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas** - Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
- **Arritmias cardíacas** - Arritmias com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).
- **Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica** - cardiopatias com crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
- **Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados** - Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).
- **Doença cerebrovascular** - Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.
- **Doença renal crônica** - insuficiência renal em estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, pacientes em diálise) e/ou síndrome nefrótica.
- **Imunossuprimidos** - Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomedidas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
- **Anemia falciforme.**
- **Obesidade mórbida** - Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40.
- **Síndrome de Down** - Trissomia do cromossomo 21.
- **Cirrose hepática** - Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.
- **Gestantes com comorbidades**
- **Puérperas com comorbidade**



### Contraindicações da vacina contra Covid-19:

- ✓ Pessoas menores de 18 anos;
- ✓ Doença febril aguda;
- ✓ Alergia ao princípio ativo ou a qualquer componente da vacina;
- ✓ Ter recebido qualquer vacina nos últimos 14 dias e
- ✓ Ter estado com Covid-19 nos últimos 30 dias.